


# ADIENTRAMIENTOS SOBRE MANEJO DE SOBREDOSIS Y NALOXONA



Capacita con diversas estrategias para prevenir fatalidades por sobredosis de opioides, y sobre cómo administrar adecuadamente la naloxona en su modalidad de aerosol nasal (comercialmente Narcan®). Toda persona o entidad que participe de nuestros adiestramientos tiene el beneficio de recibir un kit de Naloxona.

Para solicitar adiestramientos puede escribir a [fr-cara@assmca.pr.gov](mailto:fr-cara@assmca.pr.gov) o llamar al **787-763-7575 ext.1075/1726**.

ASSMCA





# DESCRIPCIÓN DE ADIENTRAMIENTOS

Durante nuestros adiestramientos se educa sobre conceptos básicos relacionados a opioides y sobredosis de esta droga. Asimismo, se capacita en contenido práctico para conocer la naloxona y su administración intranasal (Narcan®). Entre las estrategias de educación y capacitación, se aborda la identificación de sintomatología de una posible sobredosis, se visibiliza y sensibiliza sobre la alerta de salud pública por abuso de opioides, y se adiestra en el uso y manejo del Narcan®. Todo el contenido se sostiene en las recomendaciones basadas en evidencia de SAMHSA y CDC.

Para solicitar adiestramientos puede escribir a [fr-cara@assmca.pr.gov](mailto:fr-cara@assmca.pr.gov) o llamar al **787-763-7575 ext.1075/1726**.

ASSMCA





# LA NALOXONA SALVA VIDAS

Para el periodo de junio 2019 a agosto 2021, ASSMCA recibió el reporte de **739** eventos de posibles sobredosis de opioides, de las cuales el **93.68%** han sido no fatales gracias a la intervención de personas que se han **capacitado e intervenido con naloxona y reportado** estos eventos a ASSMCA.

**¡OBSERVE LAS SEÑALES,  
ALERTA A LOS OPIOIDES!**

Si usted o alguien que conoce está utilizando o ha aumentado el uso de sustancias durante la pandemia del COVID-19, es importante contactar a la **Línea PAS de la ASSMCA**.

ASSMCA



# FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE SOBREDOSIS POR OPIOIDES

- ✓ Consumo de opioides sujetos a prescripción.
- ✓ Quienes recibieron el alta de servicios en salas de emergencias tras una sobredosis por opioides.
- ✓ Combinación de opioides y medicamentos sedantes.
- ✓ Patologías como enfermedades hepáticas, pulmonares, VIH, depresión y condiciones neurológicas.
- ✓ Consumo de opioides durante un tiempo prolongado.
- ✓ Dependencia a opioides si su tolerancia se ha visto reducida.

**¡OBSERVE LAS SEÑALES,  
ALERTA A LOS OPIOIDES!**

Si usted o alguien que conoce está utilizando o ha aumentado el uso de sustancias durante la pandemia del COVID-19, es importante contactar a la **Línea PAS de la ASSMCA**.

ASSMCA



# FACTORES QUE AUMENTAN EL RIESGO DE SOBREDOSIS POR OPIOIDES

- ✓ Familiar de personas que están en posesión de opioides.
- ✓ Tratamientos rotatorios con opioides.
- ✓ Omitir información al médico.
- ✓ Error en cálculo de dosis o despacho.
- ✓ Mal uso o mal interpretación de una receta.
- ✓ Tomar medicamento con otras sustancias o bebidas alcohólicas
- ✓ Tomar medicamentos de otra persona.
- ✓ Adulteración de sustancias.

**¡OBSERVE LAS SEÑALES,  
ALERTA A LOS OPIOIDES!**

Si usted o alguien que conoce está utilizando o ha aumentado el uso de sustancias durante la pandemia del COVID-19, es importante contactar a la **Línea PAS de la ASSMCA**.

ASSMCA



# RECOMENDACIONES PARA PREVENCIÓN

Nunca combinar  
medicamentos con  
alcohol

Mantener comunicación  
con su médico primario  
sobre los medicamentos  
que tenga recetados.

Nunca tomar  
medicamentos sin  
receta y sin consultar  
con el/la médico  
primario.



Contactar al/la médico o la  
farmacia de tener alguna  
duda o encontrar alguna  
incongruencia o reacción  
inesperada al medicamento

Tomar el medicamento  
recetado según  
prescrito por el/la  
médico y despachado  
por farmacia.

## BUSCA AYUDA DE UN PROFESIONAL DE LA CONDUCTA

Si usted o alguien que conoce está utilizando o ha aumentado el uso de sustancias durante la pandemia del COVID-19, es importante contactar a la **Línea PAS de la ASSMCA.**

ASSMCA

